

Standard-Arbeitsanweisung Rettungsdienst (SAA) – Medikament
LIDOCAIN

ÄLRD in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt
Stand: 30.04.2025
Nächste geplante Überarbeitung: Juli 2027



Wirkstoff:	Lidocainhydrochlorid	Lidocain ____ % ____ mg/ml
Konzentration:	Lidocain 2 %: 20 mg/ml (Amp. 100 mg / 5 ml) Lidocain 1 %: 10 mg/ml	
Arzneimittelgruppe:	Antiarrhythmikum	

Indikationen:	• Antiarrhythmikum bei defibrillierbaren Rhythmen (Kammerflimmern und pulsloser VT) im Rahmen der Reanimation (gleichwertige Alternative zu Amiodaron)
----------------------	--

keine Anwendung, wenn:	• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff
Anwendung nach sorgfältiger Nutzen- / Risiko-Abwägung, wenn:	• entfällt
Altersbegrenzung:	entfällt

Durchführung / Dosierung:	Erwachsene • 100 mg i.v. nach dem 3. Schock • 50 mg i.v. Repetition nach dem 5. Schock Säuglinge und Kinder • 1 mg/kgKG nach dem 3. Schock • 0,5 mg/kgKG nach dem 5. Schock
----------------------------------	---

unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) / Risiken:	• Bradykardie, Überleitungsstörungen, Hypotonie
--	---

Besonderheiten:	• Cave: unterschiedliche Konzentrationen verfügbar
------------------------	--